

Dr. med. Marcello Orlandi
Dr. med. Sabine Beeler
Dr. med. Ana Maria Kunz
Prof. Dr. med. Felix Stickel
Dr. med. Matyas Czepan

DKG
KREBSGESELLSCHAFT

Zertifiziertes
Darmkrebszentrum

GASTROZENTRUM
OBACH

Fachärzte FMH für Gastroenterologie und Hepatologie
www.gastrozentrum-obach.ch

Informationsblatt für die Darmspiegelung mit Plenvu (Untersuchung am Morgen)

Liebe Patientin/Lieber Patient

Sie haben einen Termin für eine Darmspiegelung bei uns.

Ihr Termin:

Behandelnde/r Ärztin/Arzt:

Bitte melden Sie sich **15 Minuten vor der vereinbarten Zeit** in unserer Praxis.

Wir haben Ihnen die Abführmittel zur Darm-Vorbereitung mitgegeben. Bitte lesen Sie das Abführschema genau durch. Beachten Sie, dass Sie die Abführmittel bereits am Vortag der Untersuchung einnehmen müssen und es zu starkem Durchfall kommen wird. Aufgrund des verabreichten Schlafmittels für die Darmspiegelung dürfen Sie nach der Untersuchung für den Rest des Tages kein Fahrzeug lenken. Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie sich gerne telefonisch bei uns melden.

Bitte bringen Sie die beiliegende Einverständniserklärung (Vorder- und Rückseite ausfüllen) und das Personalienblatt ausgefüllt und unterschrieben mit zur Untersuchung.

Hinweis: Ihr Termin ist uns wichtig und deshalb verbindlich. Im **Verhinderungsfall** bitten wir Sie, uns spätestens 24 Stunden vorher zu benachrichtigen. Wir behalten uns vor, bei unentschuldigter Absenz einen Unkostenbeitrag zu erheben.

Wir freuen uns Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Praxis-Team Gastrozentrum Obach

Glutz-Blotzheim-Strasse 3
4500 Solothurn
Tel. 032 621 51 11
gastrozentrum-obach@hin.ch

Storchengasse 6
2540 Grenchen
Tel. 032 654 14 44
gzo-grenchen@hin.ch

Fachärzte FMH für Gastroenterologie und Hepatologie
www.gastrozentrum-obach.ch

5 Tage vor der Untersuchung Ernährung anpassen

Keine Obst- und Gemüsesorten mit Kernen (z. B. Kiwi, Trauben, Erdbeeren, Feigen, Tomaten, Gurken).

Keine Beerenkonfitüre, Müesli, Körnerbrot, Kümmel, Leinsamen, Kleie. (Körner verstopfen das Instrument).

Stoppen von Eisentabletten. Blutverdünner nach Rücksprache mit Hausarzt oder Gastrozentrum Obach, eventuell pausieren.

Am Vortag der Untersuchung

Leichtes Frühstück (z.B. Jogurt oder Weggli, keine Vollkornprodukte und keine Rohkost). Ein leichtes Mittagessen (bis spätestens 14.00 Uhr) als letzte feste Mahlzeit vor der Dickdarmspiegelung ist ebenfalls erlaubt. → **Danach dürfen Sie bis nach der Untersuchung nur klare Flüssigkeiten** zu sich nehmen.



Ab Beginn der Anwendung
von Plenvu® bis nach der
klinischen Massnahme
keine feste Nahrung zu
sich nehmen!

Trinken Sie vor, während und nach der Einnahme von Plenvu klare Flüssigkeiten, um einen Flüssigkeitsmangel zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie mindestens 0,5l an klarer Flüssigkeit zusätzlich trinken.

Erlaubt sind: Wasser, Tee, Süssgetränke, Cola, Fanta etc., Bouillon (Gewürze absieben), schwarzer Kaffee.

Nicht erlaubt sind: Milch, Alkohol, Suppen, feste Speisen oder Getränke, die Fruchtfleisch enthalten.

Sie dürfen bis 2 Stunden vor der Untersuchung trinken. Falls jedoch gleichzeitig eine Magenspiegelung gemacht wird, dürfen Sie 4 Stunden vorher nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen.

Bitte beachten:

- Durchfall und Stuhlinkontinenz sind Wirkungen von Plenvu. Dabei kann es auch zu **Schwindel** kommen. Falls Sie unter tiefem Blutdruck oder Schwindel leiden, stellen Sie sicher, dass Sie während der Abführvorbereitung nicht alleine sind. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin oder unsere Praxis.
- Diabetes-Medikamente nur nach Rücksprache mit dem Hausarzt einnehmen.
- Bitte bringen Sie eine allfällige **Medikamentenliste, Ausweise** über Blutverdünnung, Allergien, etc. mit.
- Bei Einnahme der Antibabypille kann es durch die Abführmassnahmen zu einer ungenügenden Wirksamkeit der Verhütung kommen.

Da Sie nach der Untersuchung noch unter dem Einfluss des Schlafmittels stehen, ist es **verboten am Tag der Untersuchung aktiv am Strassenverkehr teilzunehmen (kein Auto-/Fahrradfahren)**. Organisieren Sie wenn möglich eine Begleitperson oder reisen Sie mit dem ÖV.

Bitte melden Sie sich 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit in unserer Praxis.

Gerne erwarten wir Sie zum vereinbarten Termin.

Praxis-Team Gastrozentrum Obach

Fachärzte FMH für Gastroenterologie und Hepatologie
www.gastrozentrum-obach.ch

Vorbereitung für die Dickdarmspiegelung am Morgen

Zubereitung

1 Packung Plenvu® enthält insgesamt 3 Beutel. Dosis 1: 1 Beutel; Dosis 2: 2 Beutel (A+B)



DOSIS 1



Geben Sie den Inhalt von Dosis 1 in ein Gefäss, das mindestens 500 ml Flüssigkeit fassen kann.



Füllen Sie mit Wasser auf 500 ml auf. **Rühren Sie, bis sich das Pulver aufgelöst hat.** Dieser Vorgang kann **bis zu ca. 8 Minuten** dauern.

DOSIS 2



Bereiten Sie zum verordneten Zeitpunkt den Inhalt von Dosis 2 (Beutel A und B) auf die gleiche Weise zu. *Einmal zubereitet, kann Plenvu® sofort getrunken oder unter 25°C bzw. im Kühlschrank abgedeckt bis zu 24 Stunden aufbewahrt werden.*

Einnahme DOSIS 1

Vorabend des Untersuchungstags

Dosis 1
PLENVU®



0,5 l

+

klare
Flüssigkeit**



mind. 0,5 l



Trinken Sie Plenvu® sowie die zusätzliche klare Flüssigkeit aufgeteilt und **SCHLUCKWEISE** über einen Zeitraum von mindestens 1 Stunde.*

Vortag der Untersuchung um 16.00 Uhr **LICH**

Datum/Uhrzeit

Halten Sie sich während der Einnahme in Reichweite einer freien Toilette auf.



*Sie können vor, während und nach der Einnahme von Plenvu® klare Flüssigkeit trinken. Um einen Flüssigkeitsmangel (Dehydration) zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie die zusätzlich verordneten Mengen an klarer Flüssigkeit trinken.
**Wasser, klare Suppe, Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch, Softdrinks, Tee und/oder Kaffee ohne Milch.

Einnahme DOSIS 2

Vorabend des Untersuchungstags (≥ 2 Stunden später)

Dosis 2 (A+B)
PLENVU®



0,5 l

+

klare
Flüssigkeit**



mind. 0,5 l



Trinken Sie Plenvu® sowie die zusätzliche klare Flüssigkeit aufgeteilt und **SCHLUCKWEISE** über einen Zeitraum von mindestens 1 Stunde.*

Vortag der Untersuchung um 18.00 Uhr **LICH**

Datum/Uhrzeit

Halten Sie sich während der Einnahme in Reichweite einer freien Toilette auf.



Sie dürfen bis 2 Stunden vor der Untersuchung trinken. Falls jedoch gleichzeitig eine Magenspiegelung gemacht wird, dürfen Sie 4 Stunden vorher nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen.

Trinktipps während der Einnahme der Darmvorbereitung

Trinken Sie vor, während und nach der Einnahme von Plenvu klare Flüssigkeiten, um einen Flüssigkeitsmangel (Dehydratation) zu vermeiden.

- **Trinken Sie abwechselnd einen Schluck Plenvu und einen Schluck einer anderen klaren Flüssigkeit.**
- **Beim Trinken Pausen machen:**
Auf keinen Fall sollten Sie die Lösung schnell austrinken, damit Sie es „rasch hinter sich haben“. Die Folge könnte sein, dass Ihnen übel wird.
WICHTIG: Leeren Sie das Glas nicht in einem Zug, sondern schluckweise und langsam, lassen Sie sich dafür mindestens 1 Stunde Zeit.



- ☕ **Vor Plenvu warmen Tee trinken**, um den Magen „vorzuwärmen“ bzw. schluckweise warmen Tee zwischen den Plenvu-Schlucken zu sich nehmen.

Herbe Geschmacksnoten einbauen.

Wenn Sie es eher nicht so süß mögen, können Sie versuchen, herbe Teesorten wie z. B. Grünen Tee, Melissen-, Ingwer- oder Zitrontee dazuzutrinken.



- 🍬 **Für einen angenehmen Geschmack sorgen.** In den „Trinkpausen“ können Sie Kaugummi kauen, Menthol-Bonbons oder Zitronen- bzw. Orangenscheiben lutschen.



- ❄️ **Trinken Sie Plenvu bevorzugt gekühlt.** So ist der Geschmack weniger intensiv (aber Achtung: Plenvu nicht unter Kühlschranktemperatur trinken, das könnte zu Übelkeit führen).

- 🍷 **Mit Strohhalm oder aus der Trinkflasche trinken.** So umgeht man die Geschmacksnerven!

