

Liebe Patientin/lieber Patient

Bei Ihnen wurde eine Helicobacter-Infektion des Magens festgestellt, welche mittels Antibiotika behandelt werden soll.

Bitte nehmen Sie die Antibiotika zur Behandlung von Helicobacter gemäss folgendem Schema ein. Im Falle einer Allergie gegen einen der unten erwähnten Wirkstoffe bitten wir um Mitteilung.

Tag 1-10

	Morgen	Mittag	Abend	Nacht (21.00)
Esomeprazol 40mg	1	0	1	0
Pylera	3	3	3	3

Wichtig:

Nehmen Sie das Esomeprazol 30 Minuten vor der Mahlzeit ein. Pylera unmittelbar nach dem Essen einnehmen.

Trinken Sie während der Therapie keinen Alkohol (heftige Nebenwirkungen mit einem der Inhaltsstoffe von Pylera).

Bitte KEINE Tablette vergessen, d. h. alle 120 Tabletten einnehmen.

Bitte beachten: Unter Einsatz von Pylera kann sich der Stuhlgang schwarz verfärben.

Bei Durchfall kann Bifidus oder Actimel helfen. Im Falle eines Hautausschlages oder sonstigen Fragen melden Sie sich bitte beim Hausarzt oder in unserer Praxis 032 621 51 11.