

Liebe Patientin/lieber Patient

Bei Ihnen wurde eine Helicobacter-Infektion des Magens festgestellt, welche mittels Antibiotika behandelt werden soll.

Bitte nehmen Sie die Antibiotika zur Behandlung von Helicobacter gemäss folgendem Schema ein. Im Falle einer Allergie gegen einen der unten erwähnten Wirkstoffe bitten wir um Mitteilung.

#### Tag 1-10

	Morgen	Mittag	Abend
Esomeprazol 40mg	1	0	1
Clarithromycin 500mg	1	0	1
Amoxicillin 1000mg	1	0	1
Metronidazol 500mg	1	0	1

#### Wichtig:

Nehmen Sie das Esomeprazol 30 Minuten vor der Mahlzeit ein. Alle anderen Tabletten sollten mit dem Essen eingenommen werden.

Trinken Sie während der Therapie keinen Alkohol (heftige Nebenwirkungen zusammen mit Metronidazol).

Bitte KEINE Tablette vergessen, da ansonsten die Therapie erfolglos sein kann.

Bei Durchfall kann Bifidus oder Actimel helfen. Im Falle eines Hautausschlages oder sonstigen Fragen melden Sie sich bitte beim Hausarzt oder in unserer Praxis 032 621 51 11.